

Observations sur le genre *Salvia* L. (Lamiaceae) en Afrique tropicale

par

L. Pauwels (*)

Abstract. — Two American *Salvia* (*S. occidentalis* and *S. misella*) are reported for the first time as weeds in Zaïre. A general key for the eight *Salvia* known in Central Africa (Zaïre, Rwanda and Burundi) is given, with their distribution in this area.

1. *Salvia occidentalis* Swartz et *S. misella* Kunth, deux rudérales nouvelles pour l'Afrique.

Pendant mon séjour à Kisangani, j'avais remarqué à plusieurs endroits de la ville des Lamiacées rampantes à fleurs bleues, croissant à des endroits rudéralisés et plus ou moins ombragés. En comparant mes récoltes de ces plantes avec les Lamiacées de l'herbier africain de BR, il s'est avéré que ces espèces avaient déjà été récoltées à Yangambi et à Kisangani, mais étaient restées indéterminées. Les caractères de la fleur (deux étamines fertiles) me conduisaient indiscutablement au genre *Salvia*. Néanmoins Hedge (1974) n'avait pas retenu ces deux espèces pour la révision des *Salvia* d'Afrique.

En consultant plusieurs flores des régions tropicales et surtout la révision des *Salvia* américains de Epling (1939) et en comparant avec le matériel de l'Amérique tropicale de BR, j'ai conclu qu'il s'agissait de *S. misella* ou d'une espèce voisine, *S. occidentalis*. Ensuite, j'ai soumis le matériel zaïrois à Harley, spécialiste des Lamiacées américaines, qui a identifié une plante de la collection comme *S. misella* et les autres comme *S. occidentalis*.

(*) Jardin botanique national de Belgique, Domaine de Bouchout, B-1860 Meise (Belgique). — Manuscrit déposé le 16 mars 1987.

